

1. Příušní žláza - určete správné tvrzení:

- a) ústí do předsíně dutiny ústní +0
- b) ústí do vlastní dutiny ústní -0
- c) její vývod jde pod jazyk -0
- d) je uložena pod tělem dolní čelisti -0

2. Bránice je:

- a) pomocným svalem uplatňující se při usilovném dýchání -0
- b) hlavním vdechovým svalem +0
- c) hladký sval, rozložen mezi dutinou hrudní a břišní -0
- d) hlavním výdechovým svalem -0

3. Fossa ovalis na srdci:

- a) se nachází mezi síněmi +0
- b) má v dospělosti centrální otvor -0
- c) nachází se na přepážce mezi komorami -0
- d) nachází se mezi aortou a levou předsíní -0

4. Plícnice - určete správné tvrzení:

- a) vede okysličenou krev do plic -0
- b) vede odkysličenou krev z plic -0
- c) vede odkysličenou krev do plic +0
- d) vystupuje z levé komory -0

5. Mozkomíšní mok -- určete správné tvrzení:

- a) je produkován mozkovými obaly -0
- b) jeho množství je kolem 1 500 ml -0
- c) tvoří se uvnitř mozkových komor +0
- d) nenachází se v hřbetní míše -0

6. Mezi poplícnicí a pohrudnicí:

- a) je vyšší tlak než atmosférický -0
- b) je stejný tlak jako atmosférický -0
- c) je nižší tlak než atmosférický +0
- d) není pleurální tekutina -0

7. Mezi částí mozkového kmene patří:

- a) mezimozek -0
- b) prodloužená mícha +0
- c) mozeček -0
- d) basální ganglia -0

8. Senzitivní inervace obličeje je z:

- a) n. facialis (lícní nerv) -0
- b) n. trigeminus (trojklaný nerv) +0
- c) n. opticus (optický nerv) -0
- d) n. hypoglossus (podjazykový nerv) -0

9. Kde se nachází epidurální prostor:

- a) mezi tvrdou plenou mozkovou a lebkou -0
- b) mezi tvrdou plenou mozkovou a páteřním kanálem +0
- c) mezi tvrdou a měkkou plenou mozkovou -0
- d) mezi měkkou plenou míšní a pavučnicí -0

10. Žíly srdeční ústí do:

- a) levé předsíně -0
- b) levé komory -0
- c) pravé předsíně +0
- d) pravé komory -0

11. Mezi sestupné mozkové dráhy patří:

- a) dráha pyramidová +0
- b) dráha zraková -0
- c) dráha sluchová -0
- d) dráha čichová -0

12. Zvýšená aktivita parasympatiku způsobí:

- a) zrychlení akce srdeční -0
- b) rozšíření věnčitých tepen a průdušek -0
- c) zvýšení krevního tlaku -0
- d) snížení krevního tlaku +0

13. Hlavní funkcí m. quadriceps femoris je:

- a) flexe v kolenním kloubu -0
- b) extenze v kolenním kloubu +0
- c) extenze v kyčelním kloubu -0
- d) abdukce v kyčelním kloubu -0

14. V játrech obstarává funkční oběh:

- a) a. hepatica communis -0
- b) v. hepatica -0
- c) v. portae +0
- d) a. hepatica propria -0

15. Inervace mimických svalů je z:

- a) trojklaného nervu -0
- b) lícního nervu +0
- c) bloudivého nervu -0
- d) podjazykového nervu -0